

ରୋଗ ଏବଂ କୀଟନାଶକ ପରିଚାଳନା

ରୋଗ ଏବଂ କୀଟନାଶକ	ପରିଚାଳନା
ମେଡିସ୍ ପତ୍ର ବ୍ଲାଇଟ୍ (ଏମ୍ ଏଲ୍ ବି)	ବୁଣିବାର ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ପରେ ମାନକୋଜେବ @ 2.5 g / L ପାଣିର ଫୋଲିୟର୍ ସ୍ପ୍ରେ 10 ଦିନର ବ୍ୟବଧାନରେ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଆଉ ଦୁଇଟି ସ୍ପ୍ରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ
ଡୁର୍ବକମ୍ ପତ୍ର ବ୍ଲାଇଟ୍ (ଟି ଏଲ୍ ବି)	ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 2.5g ମାନକୋଜେବ କିମ୍ବା 1 ମିଲି ହେକ୍ସାକୋନାଜୋଲ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ
ବାନ୍ଧୁଆ ପତ୍ର ଏବଂ ଖଣ୍ଡ ବ୍ଲାଇଟ୍	ଫୋଲିୟର୍ ସ୍ପ୍ରେ ଆକୋକ୍ସିକ୍ସୋପ୍ରୋପିଲ୍ 18.2% + ଡିଫେନକୋନାଜୋଲ 11.4% 1ml / L ପାଣି 50 DAS ରେ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, 15 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ସ୍ପ୍ରେକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ
ପତ୍ରପାଚନ	କ୍ଲୋରାକ୍ସାମିଲିପ୍ରୋଲ (80 ମିଲି / ଏକର) @ 0.4 ମିଲି / ଲିଟର ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ
ଦାଗିତ ସ୍ପେମ୍ ବୋରର	କ୍ଲୋରାକ୍ସାମିଲିପ୍ରୋଲ @ 150ml / ହେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ
ଉଡ଼ାଣ	ଇମିଡାକ୍ସୋପ୍ରିଡ୍ @ 6 ମିଲି / କିଲୋଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜି କିମ୍ବା ଥିମିନୋକ୍ସିପ୍ରୋଲ @ କିଲୋଗ୍ରାମ ବିହନ ସହିତ ବିହନ ଚିକିତ୍ସା

ଅମଳ ଏବଂ ଶସ୍ୟ: ଯେତେବେଳେ ଫସଲର ଆବରଣ ଫିକା ବାଦାମୀ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଶସ୍ୟକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ନଖରେ ଦବାଇବା କଷ୍ଟକର | କୋବିଗୁଡିକ ପ୍ରାୟ 20% ଶସ୍ୟ ଆର୍ଦ୍ରତାରେ ଅମଳ ହୋଇପାରେ |

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡିକର ଫଳାଫଳ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କୃଷି ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡିକର ଉପଦେଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ | ଭଗୋଳିକ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଧାର କରି ଫଳାଫଳ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ |